

釧路湿原周辺地のハマキガ目録

—北海道東部産蛾類原標本日録—

飯 島 一 雄^{*}

A List of the Species of Family Tortricidae around the Kushiro Moor

Kazuo Iijima

釧路産ハマキガ科研究史

筆者の居住地である釧路湿原東縁北東部の標茶町ニツ山に、定点誘蛾燈を設けて、かれこれ30年になる。ここで採集された大蛾類については、すでに公表済みである（飯島1963、1965、1966、1967、飯島ほか1975）。だが、メイガ科以下の小蛾類は、井上寛博士を経て川辺満博士の手にゆだねられ、未知種などの一部が公表されただけである。先ず、順に、1976年までの経過を記す。

川辺(1963a)は日本産Tortricodes属を2種に整理し、新潟県赤倉、同秋葉山、北海道標茶の3産地に基づき、日本未記録種として、ウスオビハイロフユハマキを記録した。

川辺(1963b)：長野県美ヶ原、北海道標茶産の標本に基づき、日本未記録種として、ゴマフミグレハマキを記録。

川辺(1965a)：日本産Ptycholoma属を2種に整理。標茶産はアミキイロハマキを記録、残る1種オオギンシジカハマキは今回記録。

川辺(1965b)：日本産Archips属を4属に分け、標茶産はクロカクモンハマキ、カクモンハマキ、ホソアトキハマキ、オオアトキハマキ、コアトキハマキの5種。内コアトキハマキは日本未記録種で標茶特産種。

川辺(1974)：日本産Eudemopsis属を5種に分類。内3種が新種。標茶産のツマモンベニヒメハマキは、これまでウスリーから知られていた。

次に1976年以降の経過を記す。釧路産ハマキガ科を分類学的にまとめたのは今回が最初であり、それなりに意義あることと思う。

川辺コレクションに加えられたニツ山産ハマキガ科のリストを受理。クチブサガ科4種、マルハマキバガ科7種、ヒロバキバガ科1種、ハマキガ科63種（ハマキガ亜科36種、ヒメハマキガ亜科26種、テングハキバガ亜科1種）（私信1977年3月13日）。

1977年3月28日、三角紙包み標本送付。ハマキガ亜科、ヒメハマキガ亜科各1種を新たに追加（私信1977年4月4日）。

1977年11月23日、三角紙包み標本送付（52種）。1978年2月、標本と同定リスト受理。新たな追加種類数は、ハマキガ亜科8種、ヒメハマキガ亜科6種で若干の未知種を含む（私信1978年2月10日）。

1978年3月25日私信。リンゴカクモンハマキ、コホソスジハマキ、コトサトハマキ（川湯産）。ほかに川辺所蔵ニツ山産展翅標本1部受理。

1978年5月2日、飯島コレクション展翅標本、桐箱4箱におさめ発送。同年8月標本、同定リスト受理。ホソハマキガ科4種、ヒロバキバガ科1種、マルハマキバガ科1種、ハマキガ科75種（ハマキガ亜科39種、ヒメハマキガ亜科36種、私信1978年8月22日）。

1979年2月3日、第2次展翅標本送付、川辺氏同定の結果新しくハマキガ亜科5種、ヒメハマキガ亜科24種が判明（内6種は北海道未記録、私信1979年2月20日）。

今回記録したハマキガ科は合計145種で、この内ハマキガ亜科は66種、ヒメハマキガ亜科は78種、テングハマキガ亜科は1種となる。

日本未記録又は未知種はシベチャツマジロヒメハマキを含む9種（本文に明記）北海道未記録種は11種。国内での北海道特産種は標茶特産のコアトキハマキを含む9種である。

本日録作成に当り、標本の同定に全面的な協力を賜わり、かつ本文の校閲をいただき、写真を撮影下さった川辺満博士に対し銘記してお礼申しあげる。

なお本日録に用いた標本は、研究標本として釧路市立郷土博物館資料室にながく所蔵されるものであることを申し添えておきたい。

TORTRICIDAE ハマキガ科

TORTRICINAE ハマキガ亜科

1. Pandemis corylana Fabricius

ウスアミメトビハマキ

標茶町ニツ山：1♀，1951. viii. 25； 1♀，1959. viii. 24； 1♀，1963. viii. 20； 1♀，1965. viii. 30；

2♂3♀, 1976. viii. 12~26; 2♀, 1977. viii. 20;

2♂1♀, 1978. viii. 12~20.

年1化。成虫は7月後半から8月に出現する。

2. *P. chlorograptus* Meyrick ウストビハマキ

三ツ山: 1♂, 1955. vii. 3; 2♂, 1966. vii. 26~viii. 1; 1♀, 1975. vii. 15; 1♂, 1976. vii. 26; 2♂, 1977. vii. 16~25.

年1化。7月中旬から8月下旬。

3. *P. heparana* Denis et Schiffmüller

トビハマキ

三ツ山: 1♀, 1957. vii. 28; 1♂, 1965. viii. 2; 1♀, 1966. viii. 10; 1♀, 1975. X. 2; 1♂, 1977. vii. 25.

7月後半から8月、10月の個体は2化かも知れない。

4. *P. monticolana* Yasuda ヤマトビハマキ

三ツ山: 1♂, 1976. vii. 26; 2♂, 1977. vii. 18~26.

1化。7~8月、北海道未記録。

5. *P. dumetana* Treitschke アミメトビハマキ

三ツ山: 2♂, 1957. vii. 18; 1♂, 1964. viii. 13; 2♀, 1966. viii. 25~28; 1♂, 1974. viii. 14; 1♀, 1975. viii. 12; 2♂, 1976. viii. 16~26; 1♂♀, 1977. viii. 14~20.

1化。7~8月。

6. *Archips xylosteanus* Linnaeus

カクモンハマキ

三ツ山: 1♀, 1955. vii. 23; 1♂, 1956. viii. 2; 2♂1♀, 1957. viii. 12~28; 2♂, 1965. viii. 2; 2♂, 1965. viii. 2; 1♂, 1966. viii. 18; 1♀, 1972. viii. 4; 1♀, 1975. viii. 3; 2♂, 1974. viii. 13; 2♂, 1977. viii. 1~4; 1♀, 1977. ix. 6.

1化。7月後半~8月。

7. *A. viola* Falkovitsh ムラサキカクモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1974. viii. 13; 1♂, 1975. viii. 3; 1♂, 1977. viii. 14.

1化。8月。

8. *A. fuscocupreanus* Walsingham

ミダレカクモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1957. viii. 14; 2♂1♀, 1966. vii. 28~viii. 1; 2♂, 1974. viii. 2; 1♂, 1977. vii. 20.

1化。7月中旬~8月。

9. *A. crataeganus endoi* Yasuda

クロカクモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1964. viii. 13; 2♂, 1965. viii. 2~6; 1♂, 1969. viii. 2; 1♂♀, 1975. vii. 24~viii. 3; 1♂, 1977. viii. 1.

1化。7月下旬~8月。

10. *Archippus asiaticus* Walsingham

アトキハマキ

三ツ山: 2♂, 1955. vii. 6~10; 1♀, 1966. vii. 28; 1♂♀, 1975. vii. 15~24; 2♂, 1976. vii. 8.

1化。7月~8月前半。

11. *A. decretanus* Treitschke コアトキハマキ

三ツ山: 2♂, 1953. vii. 26~viii. 2; 2♂, 1957. vii. 28~viii. 2; 1♂, 1958. vii. 15; 1♂, 1965. viii. 6; 2♂1♀, 1966. viii. 1~viii. 18; 2♂, 1969. viii. 2; 2♂, 1975. vii. 20; 3♂, 1976. vii. 6~26; 1♂♀, 1977. vii. 20~25.

1化。7月後半~8月。本種は標茶産の標本により本邦から記録されたが(川辺1965)現在なお標茶町の特産、国外ではロシア北西部、ウクライナ、ヨーロッパ、イングランドなどに分布する。

12. *A. breviplicanus* Walsingham

ホソアトキハマキ

三ツ山: 1♂2♀, 1957. viii. 2~18; 1♂, 1958. vi. 25; 1♂, 1960. viii. 10; 1♂♀, 1966. viii. 4~5; 1♀, 1967. vii. 12; 1♂, 1970. vii. 22; 3♂2♀, 1977. vii. 25~viii. 1.

7月から8月前半。9~10月の個体は2化かも知れない。

13. *A. ingentanus* Christoph オオアトキハマキ

三ツ山: 1♂, 1957. vii. 16; 1♀, 1956. vii. 28; 1♂, 1959. vii. 30; 1♀, 1960. vii. 28; 1♂4♀, 1966. viii. 5~18; 1♀, 1967. viii. 4; 2♀, 1969. viii. 2; 1♀, 1974. viii. 14; 10♂1♀, 1977. vii. 28~viii. 1; 弟子屈町川湯: 1♂, 1977. vii. 27.

1化。7月中旬~8月。

14. *A. pulchra* Butler タテスジハマキ

三ツ山: 1♀, 1973. vii. 30.

15. *Hoshinoa longicellana* Walsingham

アトボシハマキ

三ツ山: 1♂, 1964. viii. 8; 1♂, 1966. viii. 18.

1化。8月。

16. *H. adumbratana* Walsingham リンゴオオハマキ

三ツ山: 1♂, 1952. vii. 19; 1♂, 1958. vii. 15; 1♂2♀, 1968. vii. 22; 2♂, 1976. vii. 6~26; 3♂2♀, 1977. vii. 25~viii. 18.

1化。7~8月。

17. *Cornicacoezia lafauriana* Ragonot

ウスキカクモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1951. vii. 23; 1♂, 1958. viii. 2; 1♂, 1963. viii. 8; 1♂, 1964. viii. 3; 2♂, 1965. viii. 10

～18; 4♂, 1966. viii. 5～18; 1♂, 1967. viii. 4;
1♂, 1976. viii. 21; 5♂, 1977. vii. 28～viii. 14.
1化。7～8月。

18. *Choristoneura diversana* Hübner

コスジオビハマキ

三ツ山: 1♂, 1966. viii. 1; 1♂♀, 1975. vii. 24～
28; 4♂1♀, 1977. vii. 25～28.
1化。7月後半～8月。

19. *Aphelia inumbratana* Christoph カゲハマキ

三ツ山: 1♂, 1966. viii. 10.

北海道特産種、国外ではアムール、ウスリーに分布す
る。

20. *Ptycholomoides aeriferana* Herrich-Schäffer

カラマツイトキハマキ

三ツ山: 1♂, 1951. viii. 8; 1♂, 1953. vii. 26;
1♂, 1955. vii. 13; 1♂, 1956. vii. 15; 1♂♀, 1958.
vii. 15～18; 2♂, 1966. vii. 26～viii. 1; 1♀, 1967.
vii. 20; 1♀, 1975. vii. 30.
1化。7～8月。

21. *Ptycholoma imitator* Walsingham

アミメキイロハマキ

三ツ山: 1♀, 1953. ix. 1; 1♂♀, 1957. viii. 8～
18; 1♂, 1966. viii. 18; 1♂, 1970. viii. 15; 3♂,
1974. viii. 14; 1♂, 1975. vii. 30; 6♂3♀, 1977. vii.
25～viii. 1; 1♂, 1978. viii. 28.
1化。7月後半～8月。

22. *P. lecheana circumclusana* Christoph

オオギンスジアカハマキ

三ツ山: 1♀, 1954. vii. 9; 1♂, 1962. vii. 1;
1♀, 1963. vii. 9; 1♂, 1966. vi. 28; 1♀, 1970.
vi. 30; 1♂, 1975. vii. 10; 2♂, 1977. vii. 6; 1♂,
1978. vii. 15.

23. *Adoxophyes orana fasciata* Walsingham

リンゴノコカクモンハマキ

三ツ山: 1♀, 1955. vii. 13; 1♂, 1957. vii. 19;
1♂, 1966. vii. 18; 2♂, 1967. vii. 12; 1♂, 1975.
vii. 20; 1♀, 1977. vii. 28.
1化。7月。

24. *Pseudeulia asinana* Meyrick (fig. 1)

オオハイジロハマキ

三ツ山: 1♂, 1954. v. 3; 1♀, 1955. v. 10; 2♀,
1956. v. 10～15; 1♀, 1957. v. 18; 1♀, 1960. v.
25; 1♀, 1962. v. 8; 1♂, 1966. v. 15; 2♂, 1967.
v. 2～8; 1♂♀, 1972. v. 3; 1♂♀, 1977. v. 4.
1化。5月。北海道未記録。

25. *Homonopsis foederatana* Kennel

ツヅリモンハマキ

三ツ山: 2♂, 1978. vii. 1～5.

26. *Argyrotaenia tricensa* Meyrick

フタモンコハマキ

三ツ山: 1♀, 1958. vi. 24; 1♀, 1966. vii. 18; 2♂,
1977. vii. 16～20; 1♀, 1978. vii. 6; 弟子屈町川湯:
1♂, 1958. vii. 9.
1化。6～7月。

27. *A. lacernata* Yasuda ウストビモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1951. vii. 28; 1♂, 1963. viii. 20.

1化。7月後半～8月。北海道未記録、本州中部山地
帯が知られていた。

28. *A. angustilineata* Walsingham

コホソスジハマキ

三ツ山: 1♀, 1952. v. 10; 1♀, 1957. viii. 20; 1♂,
1964. viii. 22; 1♂, 1965. viii. 12.
2化。5月と8月。

29. *Capua favillaceana* Hübner

ハイイロウスモンハマキ

三ツ山: 1♂, 1958. vi. 5. (川辺所蔵)

30. *Pseudargyrotoza conwagana* Fabricius

ミヤママダラギンスジハマキ

三ツ山: 1♀, 1977. vii. 18; 1♀, 1978. vi. 30; 1♀,
1964. vii. 12. 1化。6～7月。

31. *Pseudargyrotoza ditinctana* Walsingham

アオスジキハマキ

三ツ山: 1♀, 1955. vii. 10; 1♂♀, 1956. vii. 10;
1♀, 1964. vii. 6; 2♂, 1969. vii. 12～18; 1♂,
1978. viii. 10.

1化。7月、北海道未記録。

32. *Eulia ministrana* Linnaeus ボカシハマキ

三ツ山: 1♀, 1966. vii. 4; 2♂, 1978. vi. 6～20.
1化。5～6月。

33. *Cnephasia cinereopalpana* Razowski

ホソバハイイロハマキ

三ツ山: 1♀, 1953. vii. 26; 1♂, 1955. vii. 10; 1♀,
1965. vii. 22; 1♂, 1969. vii. 20; 1♂, 1971. vii. 10;
2♂3♀, 1977. vii. 16～18; 2♂, 1978. vi. 30～vii. 3.
1化。7～8月。

34. *Eana argentana* Clerck ギンムジハマキ

三ツ山: 1♂, 1952. vi. 27; 4♂, 1957. vii. 12; 3♂,
1963. vi. 30.

1化。6月後半～7月。

35. *Kawabea ignavana* Christoph

ウスオビハイイロフユハマキ

三ツ山：1♀, 1952. x. 21; 1♂, 1953. x. 10; 1♂, 1954. x. 21; 1♂, 1955. x. 13; 1♀, 1970. x. 20; 1♂, 1974. x. 16; 1♂, 1975. x. 29; 5♂, 1976. x. 15; 2♂, 1976; iv. 26~v. 4; 2♂, 1977. x. 29.

10月に出現し、成虫で越冬し越冬個体は4月中旬に出はじめ、5月前半に終る。

36. *Doloploca praeviella* Erschoff (fig. 2)

ヤチダモハマキ

三ツ山：1♀, 1952. v. 3; 1♀, 1954. v. 3; 1♀, 1957. v. 5; 1♀, 1958. iv. 30; 1♀, 1962. v. 8; 1♀, 1974. v. 8; 1♀, 1976. v. 16; 2♀, 1977. v. 4.

1化。4月後半~5月、北海道特産種、国外ではウスリー、シベリアに分布する。

37. *Spatalistis christophana* Walsingham

ギンボシトビハマキ

三ツ山：1♂, 1953. ix. 17; 1♀, 1958. viii. 20; 1♀, 1959. viii. 24; 1♀, 1962. viii. 20; 1♂, 1976. ix. 16; 1♂, 1977. viii. 14.

1化。8~9月。

38. *Acleris emargana* Fabricius

エグリハマキ

三ツ山：1♀, 1954. x. 28; 1♂♀, 1955. viii. 18~x. 26; 2♂1♀, 1976. x. 15; 1♀, 1977. x. 29.

8月と10月。本属はすべて成虫越冬するが、本種の越冬個体は標茶では未発見。

39. *A. latifasciana* Haworth ヤナギハマキ

三ツ山：1♀, 1954. x. 3; 1♂1♀, 1957. ix. 25; 1♀, 1966. x. 10; 3♂, 1975. ix. 6; 1♂3♀, 1976. viii. 26; 2♂, 1977. viii. 20~30.

8月後半から10月に出現。6月に採れたことがあるが、越冬した個体と思う。

40. *A. albiscapulana* Christoph

ニセヤナギハマキ

三ツ山：1♀, 1953. vi. 18; 2♂, 1958. ix. 20~22; 1♂, 1962. ix. 6; 1♀, 1975. viii. 26; 1♀, 1978. iv. 11.

4月の個体は成虫越冬のもの、1化は8月~9月、6月の個体は越冬の最終個体と思う。

41. *A. abietana nigrilineana* Kawabe

スジグロハマキ

三ツ山：1♀, 1955. x. 20.

42. *A. submaccana* Filipjev

タカネミダレモンハマキ

三ツ山：2♀, 1953. x. 10~20; 1♀, 1954. x. 28;

3♂, 1955. vi. 16~ix. 20; 3♂1♀, 1957. ix. 15~30; 1♀, 1958. ix. 18; 1♂, 1964. x. 2; 1♀, 1970. xi. 27; 1♂, 1975. x. 29; 1♂, 1976. v. 27; 1♀, 1976. x. 15; 1♀, 1977. v. 2; 1♂, 1977. x. 29.

越冬個体は4月に出て5月。1化は9~10月。11月に越冬中の個体をしばしば見受ける。

43. *A. paradiseana* Walsingham

ツマモンエグリハマキ

三ツ山：1♀, 1957. viii. 28; 1♂, 1956. viii. 2; 1♂♀, 1972. viii. 4; 1♂, 1975. x. 3.

8月~10月。

44. *A. caerulea* Walsingham

キボシエグリハマキ

三ツ山：1♀, 1956. ix. 2; 1♂♀, 1958. ix. 16~x. 15; 1♀, 1959. viii. 7; 1♀, 1973. ix. 28; 1♂, 1977. x. 10.

8月~10月。

45. *A. delicatana* Christoph コトサカハマキ

三ツ山：2♂, 1953. ix. 17~x. 20; 1♀, 1954. ix. 20; 1♂, 1964. viii. 14; 弟子屈町川湯：1♀, 1975. viii. 17.

1化。8月中旬~10月。

46. *A. alnivora* Oku ハンノキミダレモンハマキ

三ツ山：1♂, 1955. v. 10; 1♂, 1957. xi. 8; 1♂, 1958. x. 27; 1♂, 1971. xi. 22; 1♂, 1976. iv. 28.

越冬個体は4月に出はじめ5月。1化は9月~10月。

47. *A. filipjevi* Obratzov コウスアオハマキ

三ツ山：1♀, 1958. iv. 25.

48. *A. Cristana* Denis et Schiffermüller

トサカハマキ

三ツ山：2♂2♀, 1957. iv. 18&ix. 30~x. 4; 1♀, 1959. iv. 11; 2♂, 1964. v. 1; 1♂, 1967. viii. 4; 1♂, 1974. iv. 28; 1♀, 1976. x. 25.

越冬個体は4月に出はじめ5月いっぱい。1化は8月から10月。

49. *A. nigriradix* Filipjev ネグロハマキ

三ツ山：1♂, 1953. v. 10; 1♂, 1957. iv. 25; 3♀, 同. ix. 25~x. 18; 1♀, 1958. x. 30; 1♂2♀, 1959. xi. 10; 1♂, 1976. x. 15; 2♂, 1977. v. 4~15; 1♂, 1978. iv. 15; 雷別：1♂, 1978. x. 23.

越冬個体は4月に出はじめ5月いっぱい。1化は9月から10月。道内からは定山溪からはじめて記録された(長瀬・山根1969)。

50. *A. affinitana* Snellen プライヤハマキ

三ツ山：1♂, 1957. iv. 15; 1♂, 1957. ix. 5(川辺

所蔵)

越冬個体は4月出はじめる。1化は9月。

51. *A. roscidana amurensis* Caradja

オオウスアオハマキ

ニツ山：1♀, 1957. ix. 30; 1♀, 1958. x. 27; 1♀, 1967. v. 8; 厚岸町アヤマガ原：1♂, 1978. vi. 7.

越冬個体は4～5月。1化は9～10月。

52. *A. logiana* Clerck シロハマキ

ニツ山：1♂, 1953. vii. 24; 1♂, 1954. x. 28; 1♀, 1955. viii. 30; 1♀, 1966. x. 10; 1♂, 1959. xi. 10; 1♂, 1977. iv. 10.

越冬個体は4月に、1化は9～10月、7月後半に採れたがこがこれが1化だとすると、秋のものは2化に当るのだが7月の資料はとばしい。

53. *A. boscana ulmicola* Meyrick ニレハマキ

ニツ山：1♂, 1962. vii. 25; 1♂, 1963. vii. 24; 1♀, 1965. viii. 18. 1♂, 1970. vii. 20 (以上夏型) 1♀, 1964. v. 1; 1♂, 1976. x. 25 (以上秋型)

越冬個体は4～5月。1化は7～8月。2化は10月に出る。

54. *A. apiciana* Hübner ゴマフミダレハマキ

ニツ山：1♂, 1953. v. 10; 3♂, 1957. x. 4～14; 1♂♀, 1958. iv. 22～25; 1♂, 1959. iv. 11; 1♂, 1966. x. 10; 1♂, 1974. ix. 18; 1ex. 1976. v. 16; 1♂, 1977. iv. 10.

越冬個体は4～5月。1化は9～10月。

55. *A. uniformis* Filipjev コアミメチャハマキ

ニツ山：1♀, 1954. ix. 15; 1♂, 1964. viii. 27; 1♂, 1965. viii. 15; 2♂, 1966. viii. 28; 1♂, 1968. viii. 26; 1♀, 1973. viii. 26; 1♀, 1974. ix. 10.

1化。8～9月。

56. *A. umbrana* Haworth ヒカゲハマキ

ニツ山：1♀, 1971. iv. 2.

越冬個体は4～5月。1化。9月。

57. *A. similis* Filipjev ハイイロハマキ

ニツ山：1♀, 1953. xi. 26; 2♀, 1957. xi. 8.

1化。9月～10月。道内から温根湯からのみ知られていた(長瀬・山根1969)。

58. *A. enitescens* Meyrick セウスイロハマキ

ニツ山：1♂, 1966. viii. 28.

59. *A. hispidana* Christoph フタモンシロハマキ

ニツ山：2♀, 1952. v. 7～17; 3♂1♀, 1957. xi. 8～30; 1♂♀, 1958. x. 27; 標茶町シラルトロ沼：1♂, 1951. iv. 26; 斜里町美咲：1♀, 1958. x. 21.

越冬個体は4月に出はじめ5月いっぱい。1化は10～

11月に出る。

60. *Acleris* sp.

ニツ山：1ex, 1971. ix. 14. 日本未記録種。

越冬個体は4～5月。1化は9月。

61. *Croesia aurichalcana* Bremer

ウンモンキハマキ

ニツ山：1♀, 1953. ix. 17; 1♀, 1957. viii. 26.

1化。8～9月。

62. *C. askoldana* Christoph ギンスジカバハマキ

ニツ山：1♂, 1957. viii. 8; 1♂, 1960. ix. 2; 1♂, 1961. viii. 20; 1♂, 1962. viii. 31.

1化。8月。

63. *C. leechii* Walsingham ギンヨスジハマキ

ニツ山：1♀, 1955. vii. 23; 1♂, 1957. vii. 28; 1♀, 1966. viii. 10; 1♂, 1970. vii. 20; 1♀, 1977. viii. 18; 1♂♀, 1978. vii. 15.

1化。7月後半から8月。

64. *C. conchyloides* Walsingham ネウスハマキ

ニツ山：1♀, 1957. viii. 8.

65. *C. fuscotogata* Walsin モトキハマキ

ニツ山：1♂, 1967. viii. 24.

66. *Tortrix sinapina* Butler

ウスアミメキハマキ

ニツ山：1♀, 1957. vii. 28; 1♀, 1973. vii. 22; 1♀, 1975. vii. 30; 4♂6♀, 1977. vii. 25～28.

1化。7月～8月前半。

Olethreutinae ヒメハマキガ亜科

67. *Matsumuraeses ussuriensis* Caradja

ニツ山：1♂, 1977. v. 4 (川辺所蔵)

北海道未記録。

68. *Spilonota ermitana* Moriuti

カラマツヒメハマキ

ニツ山：2♂1♀, 1977. vii. 18; 1♂, 1956. vii. 15; 1♂2♀, 1966. viii. 1～ix. 6. 1化。7月。

69. *Dichrorampha latiflavana* Caradja

キオビヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1955. viii. 20; 1♂, 1958. viii. 24; 1♂, 1961. viii. 18; 1♂, 1963. viii. 20.

1化。8月。

70. *D. concealata* kennel

ニツ山：1♀, 1958. viii. 20; 厚岸町：2♂, 1978. vii. 25.

北海道特産種、国外ではクナシリ、樺太、シベリアなどに分布している。

71. *D. albistriana* komai

- ニツ山：1♂, 1969. viii. 10.
 72. *Laspeyresia glandicolana* Danilevsky
 クロサンカクモンヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1957. viii. 28; 1♀, 1958. viii. 13.
 1化。8月。
 73. *Laspeyresia* sp.
 ニツ山：1957. viii. 28.
 74. *Laspeyresia* sp.
 ニツ山：1♀, 1958. iv. 25.
 75. *Enarmonia major* Walsingham
 ギンボシキヒメハマキ
 ニツ山：1♂, 1965. vii. 28; 1♂, 1966. vii. 26.
 1化。7月～8月。
 76. *Fulcrifera orientis kuznetsov*
 ニセマメノシンクイ
 ニツ山：1♀, 1968. viii. 16.
 77. *Grapholitha quadristriana* Walsin
 ヨツスジヒメシンクイ
 ニツ山：1♂, 1974. viii. 14; 1♀, 1978. vii. 28.
 78. *Spilonota semirufana* Christoph
 モトアカヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1964. viii. 25.
 79. *Epiblema foenella* Linnaeus ヨモギネムシガ
 ニツ山：1♂♀, 1958. vii. 23～viii. 20; 1♀, 1959.
 vii. 28; 1♂, 1965. viii. 15; 1♂, 1966. viii. 10; 1♂,
 1975. viii. 3; 1♂, 1976. viii. 12; 2♂, 1977. vii.
 28～viii. 1.
 1化。7月後半～8月。
 80. *E. pryerana* Walsingham プライヤヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1958. ix. 10 (川辺所蔵)
 81. *E. quinquefasciana* Matsumura
 ギンスジアカチャヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1967. vi. 12; 1♂, 1977. viii. 1;
 1♂♀, 1978. vii. 3～15.
 1化。6月～7月。国内では北海道特産・函館・稚内・
 利尻島(川辺1975)札幌(楠1978)などから知られていた。
 82. *Notocelia rosaecolana* Doubleday
 バラシロヒメハマキ
 ニツ山：1♂♀, 1956. vi. 26～vii. 15; 1♀, 1957.
 vii. 24.
 1化。6～7月。
 83. *Eucosma niveicaput* Walsingham
 モンシロヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1964. viii. 22. 1♂, 1977. viii. 10.
 84. *E. metzneriana* Treitschke
 トビモンシロヒメハマキ
 ニツ山：1♂, 1953. vii. 3.
 85. *E. Cathalospis* Meyrick
 ソトジロトガリヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1957. viii. 26.
 86. *E. ommatoptera* Falkovitsh
 クロモンアカヒメハマキ
 厚岸町：2♂1♀, 1978. vii. 25.
 岩手県早池峯山より記録があるのみ(奥1969、東北昆
 虫、8. 1)。北海道未記録。
 87. *Gypsonoma ephoropa* Meyrick
 ネグロマグラヒメハマキ
 ニツ山：1♂♀, 1957. viii. 8～18; 1♀, 1977. viii. 1.
 1化。8月。
 88. *Zeiraphera virinea* Falkovitsk
 ミドリヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1954. ix. 20; 2♀, 1959. viii. 24; 1♀,
 1977. viii. 14; 2♂, 1978. viii. 12.
 1化。8月～9月。北海道未記録。川辺氏によると本
 州中部山地にも分布するという。
 89. *Z. corpulentana* Kennel ハシドイハマキ
 ニツ山：2♀, 1954. x. 3～21; 1♀, 1965. viii. 30;
 3♀, 1966. ix. 6～14; 1♀, 1973. x. 20; 3♀, 1974.
 ix. 15; 2♀, 1975. ix. 6～x. 2; 3♀, 1976. viii. 16
 ～ix. 20.
 1化。8月下旬に出はじめ、9月～10月。
 北海道特産種。川辺氏によると本州中部山地でも採れ
 るという。
 90. *Z. subcorticana* Snellen
 ミドリモンヒメハマキ
 ニツ山：2♀, 1957. viii. 28～30; 1♂, 1959. viii.
 28; 1♀, 1964. viii. 30; 1♀, 1966. viii. 12; 2♂,
 1968. viii. 15; 1♀, 1974. viii. 14; 1♀, 1976. viii.
 26; 1♀, 1977. viii. 30.
 1化。8月～9月上旬。
 91. *Z. demutata* Walsingham
 シロマルモンヒメハマキ
 ニツ山：1♀, 1953. ix. 1; 1♀, 1964. viii. 13; 1♂,
 1965. viii. 24; 1♂, 1966. viii. 5; 1♂, 1967. viii. 4;
 1♀, 1968. viii. 26; 1♂, 1970. viii. 8; 1♀, 1971. ix.
 13; 1♂♀, 1972. viii. 4; 2♂, 1973. vii. 30～viii. 6;
 1♂, 1976. viii. 26; 2♂, 1977. viii. 10～14.
 1化。7月下旬に出はじめ、8月～9月前半。
 92. *Z. argutana* Christoph ガレモンヒメハマキ
 ニツ山：1♂♀, 1955. viii. 18.

93. *Z. griseana* Hübner

ハイイロアミメヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1958. vii. 15.

94. *Zeiraphera* sp. (No118)

三ツ山：1♂, 1953. vii. 26; 1♀, 1958. viii. 10;
1♀, 1978. viii. 12; 1♂, 1955. vii. 13.

日本未記録種。

95. *Epinotia exquistana* Christoph

クロマダラヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1956. vii. 28; 1♀, 1957. viii. 20;
1♀, 1964. viii. 30; 1♂3♀, 1966. viii. 5~18; 1♂,
1974. viii. 14; 1♂, 1975. viii. 10; 1♂♀, 1977. viii.
10~14; 厚岸町アイカブ岬：1♀, 1978. vii. 25.

1化。7月後半~8月。

96. *E. stroemiana* Fabricius

三ツ山：1♂, 1953. x. 2; 1♂, 1957. ix. 30; 1♀,
1958. x. 28; 2♂1♀, 1966. ix. 14~x. 10; 1♀,
1975. x. 2; 1♂, 1976. x. 20.

1化。9月~10月。6月に採れたが、成虫で越冬した
最終個体と考える。

97. *E. solandriana* Linnaeus

セウスモンヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1951. ix. 15; 1♂, 1954. x. 17;
1♂♀, 1957. ix. 30; 1♀, 1966. x. 10; 4♀, 1967.
ix. 24~x. 12; 1♂, 1972. ix. 5; 1♀, 1975. x. 4;
1♂, 1976. ix. 28. 2♂, 1970. ix. 25.

1化。9月~10月。白紋の褐色化した個体は大変少
ない。

98. *E. paykulliana* Fabrius

カギモンヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1959. viii. 28.

1化。8月。大変少ない。

99. *E. tenerana ussuria* Denis et Schiffermüller

ハンノキメムシガ

三ツ山：1♀, 1955. vii. 20; 2♀, 1958. vii. 25~30;
1♀, 1966. viii. 16; 1♂, 1977. viii. 1; 1♀, 1978.
vii. 3.

1化。7月~8月。

100. *E. contraria* Christoph (fig. 3)

ミツモンヒメハマキ

三ツ山：2♂, 1955. vii. 13~17; 2♀, 1975. vii. 28
~30; 3♂2♀, 1977. vii. 28~viii. 18.

1化。7月~8月。北海道未記録、本邦からは長野県
から記録された種で(川辺1972)国外ではアムール、ウス
リーに分布する。

101. *E. ustulana* Hübner

キガシラアカネヒメハマキ

三ツ山：2♂, 1955. vii. 17~23; 1♂♀, 1956. vii.
28~viii. 2; 1♂, 1957. viii. 18; 1♂, 1958. vii. 22;
1♂, 1965. vii. 28; 1♂, 1974. viii. 13; 1♀, 1975.
viii. 12; 1♂, 1977. viii. 10.

1化。7月~8月。

102. *E. nisella* Clerck

ヤナギメムシガ

三ツ山：1♂, 1954. x. 21.

103. *E. maculana* Fabricius

オオナガバヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1954. x. 21.

北海道からのみ知られている。

104. *Ropalovalva lascivana* Christoph

サザナミキヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1953. vi. 18; 1♂, 1954. vi. 5; 標茶
町雷別86林班：1♂, 1978. vi. 7.

1化。5月~6月。

105. *Hikagechamakia albiguttana* Oku

三ツ山：1♀, 1965. viii. 6.

106. *Foveifera hastana* Hübner

シロスジヒロバヒメハマキ

三ツ山：2♀, 1961. viii. 1; 1♂, 1969. viii. 2.

1化。8月。

107. *Ancylis geminana* Donovan

シロオビヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1953. vi. 18; 1♀, 1957. vi. 1; 1♀,
1978. vii. 3.

1化。6月。現在のところ北海道からのみ知られて
いる。

108. *A. partitana* Christoph

カバカギバヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1955. vi. 20; 1♂♀, 1962. vi. 1.

1化。6月。少ない。

109. *A. mandariana* Walsingham

セモンカギバヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1953. vi. 18; 1♂, 1957. vi. 15; 1♂,
1958. v. 22; 1♂, 1960. vi. 15; 1♀, 1964. viii. 18;
3♂, 1977. viii. 4~14.

1化が5月後半~6月。2化が8月。

110. *A. kenneli kuznetzov* (fig. 4)

チャモンカギバヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1953. vii. 13.

本州中部山地帯から記録されている(川辺1973)。北海
道未記録。

111. *Saliciphaga caesia* Falkovitsh

ヤナギオオサザナミヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1973. vii. 30.

1化。7月。少ない。

112. *Pseudohedya retracta* Falkovitsh

オオナミスジキヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1965. viii. 15; 1♀, 1968. viii. 16.

1化。8月。少ない。

113. *Eudemopsis purpurissatana* kennel (fig. 5)

ツマモンベニヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1955. vii. 23; 1♂♀, 1956. viii. 2～10; 1♀, 1957. viii. 8; 1♂♀, 1962. vii. 20～21; 1♂♀, 1964. viii. 8; 2♀, 1966. viii. 10; 1♂, 1970. viii. 4; 5♂, 1975. vii. 30; 1♂♀, 1977. viii. 4～14.
1化。7月～8月。

114. *Pseudohedya elaborata* Kawabe

ツマキオオヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1957. viii. 8.

1化。8月。稀少種。

115. *Eudemis profundana* Fabricius

ツママルモンヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1956. vii. 2; 1♀, 1978. viii. 3 (食草エゾノウワミズザクラ)

116. *Statherotmantis pictana* Kuznetsov

キモンヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1978. vi. 30.

北海道未記録。川辺氏によると本州の山地ではかなり普通に居る由。

117. *Bactra furfurana* Haworth

ヒメイグサシンムシガ

三ツ山：1♂♀, 1965. vii. 22～viii. 6.

118. *Endothenia menthivora* Oku

ハッカノネムシガ

三ツ山：1♂, 1957. viii. 12; 1♂♀, 1978. vii. 15～viii. 3.

1化。8月。少ない。本種は奥1963(Ins. Mats. vol. 26(2)104～107)によって北海道から知られたが、川辺氏によると本州中部山地にも分布するという。

119. *E. banausopsis* Meyrick

ツマジロクロヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1957. viii. 26; 1♀, 1978. viii. 12.

120. *Endothenia* sp.

三ツ山：1♂, 1977. viii. 1 (川辺所蔵)

121. *Lobesia* sp.

三ツ山：1♀, 1957. viii. 18; 1♀, 1978. vi. 18.

122. *L. relifua* Hübner ホソバヒメハマキ

三ツ山：1978. vi. 18.

123. *Hedya inornata* Walsingham ムジヒメハマキ

三ツ山：1♀, 1956. vii. 28; 1♂, 1957. viii. 8; 2♂, 1966. viii. 5; 1♂, 1968. viii. 15; 3♂, 1977. viii. 1～4.

1化。7月後半～8月。

124. *H. vicina* Ragonot シラフオオヒメハマキ

三ツ山：1♂♀, 1957. viii. 8; 1♂, 1965. vii. 28; 1♀, 1969. viii. 1; 1♂, 1970. vii. 22; 2♂, 1971. vii. 26; 1♂♀, 1973. vii. 30; 1♀, 1974. vii. 23; 2♀, 1975. vii. 30; 1♂♀, 1976. viii. 26; 3♂2♀, 1977. vii. 16～viii. 18.

1化。7月中旬～8月。

125. *H. schreberiana* Linnaeus

シロモンヒメハマキ

三ツ山：1♂♀, 1977. vii. 16; 5♂1♀, 1978. vi. 30～vii. 6.

1化。7～8月。

126. *Hedya* sp. (fig. 6)

シベチャツマジロヒメハマキ(川辺新称)

三ツ山：1♂, 1953. viii. 2; 1♀, 1956. viii. 27; 1♀, 1957. viii. 2; 1♂, 1958. vii. 18; 1♂, 1965. vii. 22; 3♂, 1966. vii. 18～viii. 1; 1♂, 1971. vii. 26; 1♂, 1975. vii. 20; 2♂, 1977. viii. 18.

1化。7月～8月。日本未記録種。和名は発見地である標茶に献名された。

127. *Pseudosciaphila branderiana* Linnaeus

ドロヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1953. vii. 26; 1♀, 1955. viii. 13(斑紋型) 1♂, 1959. vii. 17; 1♂, 1973. vii. 20.

1化。7月後半～8月。

128. *Pristerognatha penthinana* Guenée

キシタヒメハマキ

三ツ山：1957. vi. 15.

129. *Apotomis betuletana* Haworth

ツマジロヒメハマキ

三ツ山：1♂, 1953. ix. 1; 1♂, 1956. vii. 10; 1♂, 1957. viii. 30; 1♂, 1959. viii. 29; 1♂, 1965. viii. 30; 1♂, 1966. vii. 25; 2♂, 1971. ix. 15～18; 1♂, 1976. viii. 28; 5♂1♀, 1977. vii. 20～25& ix. 8～18.

1化は7月に、2化が8月下旬～9月。

130. *Apotomis* sp.

三ツ山：1♀, 1967. vii. 14.

131. *Olethreutes siderana* Treitschke

ギンボシモトキヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1971. viii. 6; 2♂, 1977. vii. 20~viii. 18; 1♂♀, 1978. vii. 3~15.

本属はすべて年1化、モンギンスジヒメハマキとツヤスジウンモンヒメハマキは6月に出るが残りの9種は、7月~8月に出現する。

132. *O. doubledayana* Barret クロバーヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1953. viii. 1; 1♀, 1958. viii. 20; 1♂, 1965. viii. 12; 1♂, 1966. viii. 28; 2♂, 1976. vii. 6; 7♂, 1977. vii. 18~viii. 18.

133. *O. captiosana* Falkovitsh

モンギンスジヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1952. vi. 30.

134. *O. orthocosma* Meyrick

クリオビクロコヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1975. vii. 28; 1♂, 1976. viii. 12; 1♂, 1958. vii. 18.

135. *O. moderata* Falkovitsh ナツハゼヒメハマキ

ニツ山：1♂♀, 1966. vii. 28~viii. 1; 1♂, 1957. viii. 12; 2♂, 1977. vii. 16.

136. *O. pryerana* Walsingham

キスジオビヒメハマキ

ニツ山：2♀, 1966. viii. 1~4; 1♀, 1975. viii. 2; 厚岸町：3♂1♀, 1978. vii. 25.

137. *O. examinata* Falkovitsh

ニセツヤスジウンモンヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1953. vii. 26; 1♀, 1977. viii. 30.

北海道未記録。本邦からは群馬・長野・岐阜県下から記録された(川辺1974)

138. *O. morivorum* Matsumura クワヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1965. viii. 15; 1♀, 1974. viii. 13; 1♂, 1975. viii. 12.

139. *O. transversanum* Christoph

オオクリモンヒメハマキ

ニツ山：2♂, 1957. viii. 8~12; 1♂, 1964. viii. 18; 1♀, 1965. viii. 18; 1♀, 1965. viii. 18; 1♀, 1968. viii. 8; 1♀, 1977. viii. 4.

140. *O. cacuminana* kennel

ツヤスジウンモンヒメハマキ

ニツ山：2♀, 1978. vi. 6~30; 弟子屈町川湯：1♂, 1978. vii. 1.

141. *Olethreutes* sp. (No.147)

ニツ山：1♂, 1966. viii. 1; 3♂, 1978. vii. 6~15 (川辺所蔵)

本種は日本未記録種か又は新種。

142. *Celyphoides cornigerus* Oku

コキスジヒメハマキ

ニツ山：1♀, 1957. viii. 8.

1化。8月。

143. *Orthotaenia undulana* Denis et Schiffermüller

イラクサヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1967. vi. 12.

1化。6月。北海道特産。国外ではシベリア・ヨーロッパに分布する。

144. *Cymolomia hartigiana* Ratzeburg

トウヒヒメハマキ

ニツ山：1♂, 1978. vii. 3.

Sparganothinae テングハマキガ亜科

145. *Sparganothis pilleriana* Denis et Schiffermüller

テングハマキ

ニツ山：2♂, 1957. viii. 8~18; 2♂, 1958. vii. 25~viii. 20; 1♂♀, 1963. vii. 30~viii. 8; 1♂, 1965. vii. 22; 1♂, 1966. viii. 4; 2♂, 1971. viii. 6~20; 1♂, 1976. viii. 12; 1♂3♀, 1977. vii. 28~viii. 14.

1化。7月~8月。幼虫はカラマツの新芽にしばしば大害を与える。

参考文献

- 飯島 一雄 1963：北海道東部の蛾類目録(I)蛾類通信 No.33
 飯島 一雄 1965：北海道東部の蛾類目録(II)蛾類通信 No.37
 飯島 一雄 1966：北海道東部の蛾類目録(III)蛾類通信 No.44
 飯島 一雄 1967：北海道東部の蛾類目録(IV)蛾類通信 No.48
 飯島 一雄 1975：釧路湿原と周辺地の昆虫類、釧路湿原総合調査報告書：161~214
 川辺 湛 1972：日本産ヒメハマキガ亜科の2新種と3未記録種：Tinea' vol. 9(1) 242~246.
 川辺 湛 1963a：日本産 Tortricodes 属の再検討：Tinea, vol. 6(1/2) 5~8.
 川辺 湛 1963b：日本産ハマキガ亜科の3種類と1未記録種の記載：蝶と蛾, vol. 14 (3)70~75.
 川辺 湛 1965a：日本産 Ptycholoma 属の再検討：Tinea, vol. 7(1)77~80.
 川辺 湛 1965b：本邦産 Archips 属の再検討：蝶と蛾, vol. 16(1/2)13~40.

川辺 湛 1973：ヒメハマキガ亜科の6日本未記録種と1既知種について：蛾類通信，No74，236.

Kawade 1974：On the Japanese species of the genus eudemopsis Falkovitsh: kontyû, vol. 42(4)388~394.

川辺 湛 1975：ヒメハマキガ亜科の4日本未記録種と1既知種について：蛾類通信，No84，393~395.

長瀬良一・山根正気 1969：札幌産 Acleris 属(ハマキガ科)について：蛾類通信，No57，649~652.

楠 祐一 1978：北海道中央部で得られた数種のハマキガ類：誘蛾燈，No71，17.

小野 洸 1967：東大雪地域生物相：上士幌町文化叢書第1集

保田淑郎 1976：日本のハマキガ亜科の分類：蛾類通信：No86，434~437 (紹介川辺)









Fig. 1 *Pseudeulia asinana* Meyric オオハイジロハマキ
 Fig. 2 *Doloploca praeviella* Erschoff ヤチダモハマキ
 Fig. 3 *Epinotia Contrariana* Christoph ミツモンヒメハマキ
 Fig. 4 *Ancyliis kenneli* Kuzne チャモンカギバヒメハマキ
 Fig. 5 *Eudemopsis purpurissatana* Kennl ツマモンベニヒメハマキ
 Fig. 6 *Hedya* sp. シベチャツマジロヒメハマキ
 (すべて標茶町二ツ山産)