

予防接種で感染症を防ぎましょう!!

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、時間の経過とともに自然に失われていくため、自分自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

予防接種を受けましょう

ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ)、BCG、麻しん風しん混合、水痘、二種混合、子宮頸がんの予防接種は、医療機関で年間を通して実施しています。時間等の詳細については14ページの「予防接種実施医療機関一覧」をご覧ください。



【問合先】

市健康推進課
(MOO 3階 ☎ 31-4524)
阿寒町行政センター保健福祉課
(☎ 66-2121)
音別町行政センター保健福祉課
(☎ 01547-9-5151)

二種混合2期(学童二種混合)予防接種はお済みですか？

二種混合(ジフテリア、破傷風)2期予防接種は、乳幼児期に受けた三種混合予防接種の免疫効果を高めるため、11～12歳の間に1回接種します。対象のお子さんには、学校を通じてご案内しています。

まだ接種がお済みでない方は、14ページの医療機関で接種しましょう。13歳の誕生日の前日までは無料(公費負担)で接種できます。

追加接種はお済みですか？

四(三)種混合、ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌の予防接種は、初回の接種終了後、一定の期間を空けて「追加接種」が必要です。

追加接種までの期間はワクチンの種類によって異なりますが、それぞれのワクチンには病気の予防のため、受けるのが望ましいとされる「標準接種期間」(下表参照)があります。

期間が空いてしまうことから、つい忘れてしまいがちな追加接種ですが、是非、適切な期間内に追加接種を受けましょう。

ワクチン接種は生後2カ月から

生まれたばかりの赤ちゃんは感染症に対する免疫が未発達のため、感染症にかかると重症化しやすく入院が必要になったり、場合によっては命に関わったりすることもあります。そうならないために予防できる病気はきちんとワクチン接種をしましょう。ヒブワクチンや、小児用肺炎球菌ワクチンは生後2カ月になったら接種できるようになります。

また、乳児期には多くの予防接種をしなければなりません。一度に複数のワクチンを接種する同時接種という方法もあります。

予防接種の進め方や同時接種については小児科にお問い合わせください。

●水痘(水ぼうそう)の予防接種を受けましょう

昨年10月より、水痘の予防接種が定期接種化され、無料で接種できるようになりました。

対象となるお子さんは、生後12～36カ月未満のお子さんです。

水痘は、非常に感染力の強い病気で、5歳までには約80%のお子さんがかかるといわれています。症状としては、だるさ、食欲不振、発熱、せき、発しん、水疱などが出ます。まれに、症状が重くなったり、長期化したり、入院が必要となり死亡したりすることもあります。

水痘の発病、かかったとしても重症化を防ぐために、生後12カ月になったらなるべく早めに予防接種を受けましょう。

種類	対象年齢 (無料で接種が受けられる年齢)	標準接種年齢 (病気の予防のため、受けるのが望ましい年齢)	回数
ヒブ(Hib)	[初回]生後2カ月～5歳未満	初回接種の開始が生後2～7カ月未満	4～8週間までの間隔をおいて3回(3回目は生後12カ月未満に終了させる) ※接種開始年齢により回数は異なります。
	[追加]生後2カ月～5歳未満	初回接種(3回)終了後、7～13カ月の間に接種	1回
小児用肺炎球菌	[初回]生後2カ月～5歳未満	初回接種の開始が生後2～7カ月未満	27日以上の間隔をおいて3回(3回目は生後12カ月未満に終了させる) ※接種開始年齢により回数は異なります。
	[追加]生後2カ月～5歳未満	初回接種(3回)終了後、60日以上の間隔をおいた後、生後12カ月以降に接種	生後12～15カ月の間に1回
四種混合 {百日せき ジフテリア 破傷風 ポリオ}	[第1期初回]生後3カ月～7歳6カ月未満	生後3～12カ月	20～56日(3～8週間)までの間隔をおいて3回
	[第1期追加]生後3カ月～7歳6カ月未満 1期初回接種(3回)終了後、6カ月以上の間隔をおいて接種	1期初回接種(3回)終了後、12～18カ月の間に接種	1回
BCG	生後1歳未満	生後5～8カ月未満	1回
麻しん(はしか) 風しん(三日ばしか) 混合	[第1期]生後12～24カ月未満		[第1期] 1回
	[第2期]5歳以上7歳未満であって、小学校就学前1年間(入学する年の3月31日まで)	【平成27年度対象者】 平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ	[第2期] 1回
水痘(水ぼうそう)	生後12～36カ月未満	1回目 生後12～15カ月 2回目 1回目終了後、6～12カ月の間隔をおいて接種	2回
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	[第2期]11～12歳	11歳	1回
子宮頸がん予防 ワクチン	小学校6年生～高校1年生相当年齢の女子	【平成27年度対象者】 平成11年4月2日～平成16年4月1日生まれ	3回 ※接種間隔はワクチンにより異なります。